

Die Aetiologie der Kieferklemme.

Inaugural-Dissertation

zur Erlangung

der

zahnärztlichen

DOKTORWÜRDE

der

Hohen Medizinischen Fakultät

der

Rheinischen Friedrich Wilhelms-Universität

zu Bonn.

Vorgelegt am 9. 10. 1936

von

DORELIESE KÜHNE

Zahnärztin aus Dortmund.

Gedruckt mit Genehmigung der medizinischen Fakultät
der Universität Bonn.

Referent: PROF. DR. PROELL



Die Aetiologie der Kieferklemme.

**Meinen lieben Eltern
in Dankbarkeit gewidmet.**

Die Ätiologie der Kieferklemme.

A. Kurzer anatomischer Überblick.

B. Die Ätiologie der Kieferklemme.

1. arthrogen.
2. myogen.
3. neurogen.
4. die narbige Kieferklemme.

C. Die Therapie.

Die Ätiologie der Kieferklemme.

A. Die Kieferklemme stellt ein häufiges Krankheitsbild in der zahnärztlichen Praxis dar. Mannigfaltig sind die Ursachen, die den Zustand der Mundöffnungsbehinderung hervorrufen. Sehr häufig sind es Prozesse, die nicht mehr in das Gebiet des Zahnarztes fallen. Sie zwingen ihn dann, den Chirurgen, Neurologen oder Arzt der inneren Medizin als Berater hinzuzuziehen, um die Ursache der Kieferklemme aufklären zu helfen. Aus diesem Grunde erscheint es angebracht, und von besonderem Interesse, einmal alle die Ursachen zusammenzustellen, deren Ausdrucksform die Kieferklemme ist, sei es als Begleitererscheinung, als Folge oder als eines der wichtigsten und oft ersten Symptome einer Krankheit und somit Beweismittel zur sicheren Diagnosestellung. Der eigentlichen Ausführung vorliegender Arbeit möchte ich in kurzen Zügen den anatomischen und histologischen Aufbau des Kiefergelenkes vorausschicken.

Das Kiefergelenk setzt sich zusammen aus:

dem Condylus mandibularis

des Fossa mandibularis

dem Tuberculum articulare

dem Discus articularis

der Kapsel und den Gelenkbändern, die als Verstärkungsbänder der Gelenkkapsel anzusehen sind. Dies als Ganzes. Im einzelnen genommen, bedingt die eigenartige Gestaltung des Diskus — bikonkave Scheibe — eine Gelenkbildung aus zwei Gelenkhöhlen. Die eine ist für das Tuberculum articulare bestimmt und reicht von der Mitte des Tuberculum bis ungefähr zur Mitte der Fossa articularis, die andere gehört dem Condylus an. Dieser liegt jedoch nicht vollkommen in der Gelenkpfanne, sondern er ist in Ruhestellung der absteigenden Seite des Tuberculum angelegt; ein Grund dafür, daß durch Druck von außen der Kiefer im ganzen etwas zurückgeschoben werden kann.

Histologisch gesehen, ist das obere Gelenk mit einer verhältnismäßig dünnen Knorpelschicht versehen. Stärker ist der Diskus als Knorpelscheibe in sich. Im unteren Gelenk erstreckt sich der Knorpelüberzug bis zur halben Höhe des Condylus. Denn der vordere Teil des Kieferköpfchens besteht aus echtem Faserknorpel mit Knorpelzellen, der hintere Teil aus straffem Bindegewebe. Die mit echtem Knorpelüberzug versehene Seite des Kieferköpfchens ist dem Tuberculum articulare zugewandt.

B.

I.

Wie kommt es nun zur Entzündung und somit auch als Begleitererscheinung zur Funktionsstörung des Kiefergelenkes? An sich nimmt das Kiefergelenk innerhalb der Gelenkreihe des Körpers eine gefonderte Stellung ein. Wohl liegt es mit seiner lateralen Seite dicht unter der Haut und dem Unterhautfettgewebe und ist gut abtastbar, doch ist die Entzündungstendenz des Kiefergelenkes gegenüber den andern Gelenken wesentlich geringer. Insulte treffen das Kiefergelenk z. B. nicht in dem Maße wie andere Körpergelenke. Orlov spricht sogar von einer geringeren Disposition des Kiefergelenkes zur selbständigen Entzündung. Früher sah man in der Kleinheit und der geschützten Lage des Gelenkes den Grund dafür, daß selbständige Entzündungen, prozentual gesehen, seltener vorkommen. Dann trat Henle mit der Meinung auf, die auch heute noch gilt, daß die geringe Neigung zur selbständigen Entzündung in dem

histologischen Aufbau des Gelenkes zu suchen ist. Die anderen Gelenke besitzen nämlich an den Gelenkenden eine sehr dicke Knorpelschicht, die ihrerseits wieder für eine reichliche Blutversorgung spricht. Beim Kiefergelenk dagegen liegen die Verhältnisse anders. Der dünne Knorpelüberzug allerseits, auch in der Fossa mandibularis, sorgt zwar nicht für eine so günstige Durchblutung, wie sie bei den anderen Gelenken vorliegt, doch sie ist ausreichend und andererseits der Grund für die geringere Gelegenheit und Neigung zur Hyperämie und somit auch zur Entzündung.

Nachgewiesen ist, daß die meisten akuten Arthritiden durch Eitererreger hervorgerufen werden und pyogene Entzündungen darstellen. In geringerer Anzahl sind dann akute Kiefergelenkentzündungen im Verlauf einer Gonorrhoe als Arthritis gonorrhoea beobachtet worden. Weiter ist die Arthritis actinomycotica zu nennen und endlich die Arthritis rheumatica, die bei Bestehen einer Polyarthritis gern das Kiefergelenk mitbefällt. Eitererreger sind bei der Arthritis rheumatica nicht immer feststellbar, doch kann durch Eindringen von Eitererregern in das erkrankte Gelenk die entzündliche rheumatische Arthritis zur pyogenen Arthritis werden.

Die akute Arthritis beginnt als seröse Entzündung, d. h. intraartikulär und auch periartikulär bildet sich seröses Exsudat. Auf dieser Basis bleibt die Entzündung bei der rheumatischen Arthritis gewöhnlich stehen. In den anderen Fällen aber, wo Eitererreger in das Gelenk eindringen, kommt es bald zu einer Ansammlung von Leukozyten, so daß in kurzer Zeit eine pyogene Entzündung vorliegt. Nicht selten geschieht es aber auch, daß durch Einwanderung von Bakterien in das Gelenk die akute Arthritis durch die bakteriellen Gifte in die schwerste Form übergeführt wird, in die nekrotisierende Entzündung. Sie ist dadurch charakterisiert, daß es zum Gewebstod innerhalb des Gelenkes kommt, daß Kapsel-, Knorpel- oder Knochenteile vollkommen absterben.

Die Ursachen, die zu den oben erwähnten Formen der Arthritis führen, sind sehr verschiedener Art. So kann das Kiefergelenk infiziert werden:

1. Durch eitrige Prozesse aus der Nachbarschaft, wie sie vorliegen bei einer Otitis media, einem Furunkel des Gehörganges, einer Parotitis, einer Osteomyelitis des aufsteigenden Astes, bei Lymphangitis, Erysipel oder einer Phlegmone. Den Eitererregern ist es ein leichtes, von der erkrankten Stelle aus den Weg in das Kiefergelenk zu finden. Auch eitrige Prozesse im Munde können das Kiefergelenk in Mitleidenschaft ziehen. Selbst eine Tuberkulose des Kiefergelenkes ist möglich durch Fortleitung der Tuberkelbazillen oder ihrer Toxine aus der Nachbarschaft in das Gelenk.

2. Durch hämatogene Infektion im Anschluß an Infektionskrankheiten: Scharlach, Typhus, Malaria, Variola, Pertussis, Pneumonie, Pyämie, Dysenterie, auch nach Anginen sowie durch Eiterherde, die an beliebigen Stellen des Körpers lokalisiert sein können.

3. Nach Verletzungen.

Hierfür kommen Traumen ursächlich in Betracht, Schuß- und Stichverletzungen, bei denen die äußeren Weichteile zerrissen werden und das Kiefergelenk gleichzeitig mit eröffnet wird. Ferner kommt es bei Unfällen meist zu einer Fraktur des Gelenkfortsatzes und häufig auch gleichzeitig zu einer Zertrümmerung des dünnen äußeren Gehörganges. Auch in diesen Fällen ist der Weg zur Infektion des Kiefergelenkes nicht schwer.

Als Symptom zeigt sich die akute Arthritis stets mit einer Behinderung der Mundöffnungsbewegung verbunden. Die Grade der Kieferklemme sind dem Charakter der Arthritis angepaßt. Bei den leichteren Formen empfindet der Patient Schmerzen nur beim Öffnen des Mundes, so daß er, um Ruhe zu haben, jede unnötige Bewegung vermeidet. In vorgeschrittenen Stadien aber steigert sich die Kieferklemme bis zur völligen Unmöglichkeit, den Mund zu öffnen. Wir finden fernerhin intensiven Druckschmerz in der Gelenkgegend, der in der Höhe des Gelenkspaltes besonders deutlich empfunden wird. Eine äußerlich sichtbare Schwellung des Gelenkes braucht in diesen Fällen nicht vorzuliegen. Geringe Temperaturerhöhung ist bei der akuten Arthritis stets vorhanden, sie steigt mit zunehmender Verschlechterung des Zustandes.

Bei der vollentwickelten, der eitrigen Entzündung des Kiefergelenkes sind alle Symptome deutlich vorhanden. Die Kieferklemme ist meist total. Das Allgemeinbefinden des Patienten denkbar schlecht. Das klinische Bild der Gelenkeiterung gleicht in allen Zügen dem einer schweren Infektionskrankheit, die mit sehr hohem Fieber einhergeht. In diesem Stadium fehlt auch niemals eine deutlich sichtbare Schwellung des erkrankten Gelenkes, die sowohl innerhalb wie außerhalb des Mundes feststellbar ist. Die Schwellung ist anfangs nur auf die Gelenkgegend beschränkt, sie breitet sich jedoch sehr bald aus und greift auf die Schläfen und Parotisgegend über. Das Ödem hat zunächst teigigen Charakter, es verhärtet sich aber bald, auch die Haut rötet sich und heftige Schmerzen peinigen den Kranken. Der Eiter, der anfänglich im Innern des Gelenkes lokalisiert war, sucht sich Abfluß zu verschaffen. Er hat inzwischen die Kapsel durchbrochen, sich periartikulär ausgedehnt und ist bei günstiger Entwicklung bis unter die Haut vorgedrungen. Es kommt zur Abszeßbildung und zum Durchbruch nach außen. Sehr häufig aber bricht der Eiter auch in den Gehörgang ein und täuscht dann eine Otitis media vor, zumal auch die Schmerzen jetzt nachlassen. Die Kieferklemme aber, die ja von Anfang an das Krankheitsbild begleitet hat, verhütet die unrichtige Diagnose, da sie stets bei einer Otitis media fehlt.

Die akute Arthritis, ganz gleich ob serösen, eitrigen oder gonorrhöischen Charakters, entwickelt sich sehr schnell und erreicht schon in wenigen Tagen ihren Höhepunkt. Sie ist, wie schon gesagt, stets mit Kieferklemme vergesellschaftet. Für die rheumatische Arthritis ist das hervorragendste Symptom die plötzliche Unbeweglichkeit des einen oder beider Gelenke, sowie eine leichte Schwellung der Gelenkgegend. Die Arthritis actinomycotica dagegen braucht mehrere Wochen bis Monate zur Entwicklung des eigentlichen Krankheitsbildes, weil es erst über eine Aktinomykose der Wange oder des Unterkieferkörpers zur Erkrankung des Kiefergelenkes kommt. Fieber ist selten vorhanden. Die Kieferklemme beherrscht aber schon frühzeitig das Bild, doch ist sie zunächst durch die Infiltration der Kaumuskeln bedingt. Die Kieferklemme ist dann hochgradig, wenn der Prozeß das Gelenk erreicht hat.

Die Heilungsaussichten der akuten Arthritiden sind bei richtiger Behandlung nach den neuesten Angaben denkbar günstig. Selbst bei schwersten pyogenen Entzündungen, die mit Nekrose einzelner Gelenkanteile verliefen, konnte Wasmund noch eine gute Funktion des Kiefergelenkes herbeiführen.

Anders dagegen liegen die Verhältnisse bei den chronisch eitrigen Entzündungen des Kiefergelenkes. Wird der richtige Zeitpunkt zur Behandlung veräußert und geht die Entzündung in den chronischen Zu-

stand über, dann sind die Aussichten für eine restitutio ad integrum bei weitem nicht so günstig. Die Vielheit der Fälle hat so gar ergeben, daß chronische Entzündungen des Kiefergelenkes gewöhnlich unter dem Bilde der Ankylose zum Stillstand kommen. Besteht nämlich eine intraarticuläre Entzündung längere Zeit über, dann kommt es nach Abklingen der akuten Erscheinungen zu Verwachsungen innerhalb des Gelenkes. Ebenso kann es selbst nach Abfluß des Eiters aus der Gelenkhöhle von selbst oder nach chirurgischer Behandlung, nachträglich noch zur Verödung des Gelenkes kommen. Die Gelenkhöhle schrumpft dann ein, es bildet sich Narbengewebe, das seinerseits regressiven Veränderungen unterliegt, das verkalkt oder verknöchert. Dieses letzt Erwähnte trifft häufig für solche Patienten zu, die nur lässig zur Nachbehandlung erscheinen. Es besteht dann immer noch die Gefahr der völligen Fixierung des Kiefergelenkes. Denn wegen der noch immer vorhandenen Kieferklemme ist die Gefahr der Narbenbildung innerhalb des Gelenkes und in der Umgebung des Gelenkes noch nicht vorüber, selbst nicht die Gefahr der knöchernen Vereinigung des Unterkiefers mit dem Jochbogen oder der Schädelbasis.

Für eine Ankylose des Kiefergelenkes sind dann weitere ätiologische Momente gegeben in der Folge von Luxationen und Frakturen der Gelenkfortsätze. Auch nicht reponierte Unterkieferluxationen kommen ursächlich für eine Ankylose in Betracht, sowie erhebliche Schußverletzungen.

Auch die Zange des Geburtshelfers hat schon durch Druck oder Fraktur eine Verödung mit anschließender Verknöcherung des Kiefergelenkes herbeigeführt. Angeborene Ankylosen sind dagegen äußerst selten zu verzeichnen. Orlov z. B. hat nur zwei derartige Fälle unter seinem Patientenmaterial gefunden.

Es ist dann noch als letztes die Arthritis deformans als Ursache für eine Mundöffnungsbehinderung anzuführen. Auch bei diesem Krankheitsbild ist die Kieferklemme arthrogen bedingt. Diese Kiefergelenkentzündung unterscheidet sich jedoch insofern von dem bereits erwähnten, als sie eine chronisch produktive Entzündung des Kiefergelenkes darstellt und deshalb als Krankheit für sich anzusprechen ist. Der Beginn der Arthritis deformans äußert sich in einem Rauheitsgefühl nebst Knacken im Gelenk bei den Kaubewegungen. Schmerzen treten nur zeitweilig auf, sie strahlen dann bis zum Ohr und darüber hin aus. Der Verlauf der Krankheit ist ungemein chronisch und zeichnet sich im späteren Stadium besonders durch die meist pilzförmige Umgestaltung des Kieferköpfchens aus. Auch das Gelenk wird dementsprechend umgeformt, gleichzeitig kommt es auch zu Knochenwucherungen an den Rändern des Gelenkes. Die Kieferklemme ist im Anfang nur mäßig vorhanden, sie nimmt aber im weiteren Verlauf immer mehr zu, wird total, oder kann sich auch durch die pathologische Knochenneubildung als Kiefer Sperre dartun.

Die Ätiologie dieses deformierenden Prozesses ist noch nicht endgültig geklärt und hat schon zu den verschiedensten Hypothesen Anlaß gegeben. Berberich vertritt die Ansicht, daß die meisten Fälle endogen bedingt sind, daß auf Grund endokriner Störungen ein oder beide Gelenke befallen werden, die Ernährung des Knorpels und Knochens im erkrankten Gelenk regelwidrig wird und sich in der bekannten Form auswirkt. Axhausen, Lenz, Konjetzny und Dufourmentel verlegen auf Grund mikroskopischer Untersuchungen die Ursache des Leidens in den Diskus. Axhausen sieht dabei die Ursache dieser deformierenden

Gelenkerkrankung als Involutionsvorgang an, der durch Überbeanspruchung des Diskus, infolge von Bißanomalien, Artikulationsstörungen oder unregelmäßig verteilter Belastung des Kiefergelenkes ausgelöst wird. Diese chronisch-funktionelle Reiztheorie erscheint wohl die einleuchtendste, weil sie neben der reinen Theorie mit mikroskopischen Beweisen belegt ist.

II.

Die zweite Art der Kieferklemme, die den Zahnarzt sehr häufig beschäftigt, ist die myogene Kieferklemme. Man spricht dann von myogener Kieferklemme, wenn nach Abklingen des eigentlichen ursächlichen Herdes die Entzündung innerhalb der Kaumuskulatur fortbesteht und die Kontraktur des Kiefergelenkes weiterhin unterhalten wird.

Eine Unterabteilung in dieser Gruppe bildet die reflektorische Kieferklemme. Sie ist darauf zurückzuführen, daß die Muskelsubstanz an sich von der Entzündung verschont bleibt, wohl aber die Ansatzstelle des Muskels sich im entzündeten Gebiet befindet. Beim Sprechen oder bei den Kaubewegungen aber wird dieser Muskel beansprucht, und die Folge ist, daß heftige Schmerzen auftreten und der Patient rein reflektorisch vermeidet, den Mund weiter zu öffnen. Zwischen beiden Formen, myogener und reflektorischer Kieferklemme, aber besteht mit geringer Einschränkung ein derart fließender Übergang, daß man, vom Stand der Praxis aus gesehen, von einer besonderen Einteilung Abstand nehmen kann.

Was nun die myogene Kieferklemme anbetrifft, so läßt sich sagen, daß sie sehr üble Folgen nach sich ziehen kann. Wenn nämlich die Kaumuskeln für länger von entzündlichen Infiltraten durchtränkt werden, gehen ihre kontraktilen Elemente vielfach zugrunde. Sie werden bindegewebig durchsetzt, unterliegen also der Narbenbildung, und beeinträchtigen dadurch die normale Funktionstätigkeit der Kiefer. Seggel hat unter anderen diesen Beweis erbracht. Er hat Muskel, die über längere Zeit entzündlich durchsetzt waren, mikroskopisch untersucht und gefunden, daß innerhalb der Muskeln eine interstitielle Myositis entstanden war, daß zugrunde gegangene Muskelelemente durch Bindegewebe ersetzt waren und anzeigten, daß solche Prozesse innerhalb des Muskelgewebes unter Narbenbildung ausheilen. Aus diesem Grunde ist es unbedingt erforderlich, daß einer entzündlichen Kontraktur rechtzeitig entgegen gearbeitet wird, um eine derartige bindegewebige Verdichtung der Muskel zu verhüten.

Ätiologische Momente, die zu diesen Erscheinungen führen können, sind alle entzündlichen Vorgänge, die sich im Munde und Rachen, im Gesicht, am äußeren Ohr, auch am obersten Halsabschnitt abspielen, die wegen der weitreichenden Ödembildung die Kaubewegungen beeinträchtigen. Im einzelnen genommen ist es in erster Linie die Dentitio difficilis, sowohl bei Kindern, als auch später der erschwerte Durchbruch des Weisheitszahnes bei Erwachsenen. Gerade der untere Achter liegt häufig verlagert, entweder gekippt oder zu hoch im aufsteigenden Ast. Er gerade bietet durch die beim Durchbruch entstehende Zahnfleischtasche den stagnierenden Speiseresten mit ihren Bakterien beste Gelegenheit, eine schwere Entzündung hervorzurufen, charakterisiert durch Schwellung und Infiltration der Weichteile und hochgradige Kieferklemme.

Periodontitis, Kieferostitis, Stomatitiden, ein subperiostaler Abszeß an den unteren Molaren sind weitere Ursachen.

Auch Wangenabszesse, die durch infektiöse Periodontitiden an den unteren Molaren aus entstanden, werden infolge Mitbeteiligung der Kaumuskeln von hochgradiger Kieferklemme begleitet. Gleichfalls bedingen Blutaustritte in einen Kaumuskel die gleiche Erscheinung.

Mundbodenphlegmone sowie perimaxilläre Phlegmonen, teils von den Zähnen aus, teils durch Speichelfein verursacht, beeinträchtigen in gleicher Weise die Kaubewegungen.

Nach fehlerhaft ausgeführter Mandibularanästhesie tritt mitunter vorübergehende entzündliche Kieferklemme ein; auch bei der lokalen Injektion an den Molaren kann diese Kieferklemme eintreten, wenn Muskelfasern verletzt werden und diese sich entzündlich kontrahieren.

Furunkel und Abszesse in der Umgebung des Kiefergelenkes, im Gesicht und weiter oberhalb in der Temporalisgegend, bedingen gleichfalls häufig infolge ödematöser Durchtränkung des Nachbargewebes eine Bewegungshemmung des Unterkiefers.

Selbst in den seltenen Fällen, wo die Speicheldrüsen tuberkulös befallen sind und der tuberkulöse Prozeß an Ausmaß zunimmt, kann als Folge davon Kieferklemme eintreten.

Vor allem aber ist die Osteomyelitis des aufsteigenden Astes ursächlich anzuführen, und nicht zuletzt die Aktinomykose. Bei letzterer gerade tritt, wie bereits erwähnt, die Kieferklemme schon sehr frühzeitig ein und zeichnet sich durch besondere Hartnäckigkeit aus. Der Grund hierfür ist auf ein Befallenwerden der Kaumuskulatur zurückzuführen, weil gerade diese durch die derbsträngigen Neubildungen, die der Erreger hervorruft, ihrer Geschmeidigkeit beraubt werden.

Schließlich können auch benigne sowie maligne Tumoren Ursache einer myogenen Kieferklemme sein, wenn sie in den Weichteilen, die das Kiefergelenk umgeben, lokalisiert sind und dadurch raumbeengend wirken.

Die vollendetste Form der myogenen Kieferklemme aber haben wir bei der Myositis ossificans progressiva, ein Leiden, das zum Glück nicht sehr häufig vorkommt. An sich setzt diese Krankheit schon in frühester Jugend ein. Sie beginnt in den Rücken- und Nackenmuskeln, greift anschließend auf die Extremitäten über und vor allem auf die Kaumuskulatur, von der sie besonders den Masseter und die Pterygoidei bevorzugt. Es kommt dabei zunächst zur entzündlichen Schwellung der befallenen Muskeln, und im späteren Stadium werden diese dann von Knochengewebe durchsetzt. Der allgemeine Kräftezustand dieser Patienten ist sehr geschwächt, er wird noch vermindert, wenn eben die Kaumuskeln mit in den Prozeß einbegriffen sind und die Nahrungsaufnahme durch die stark fixierten Kiefer fast völlig unmöglich ist.

Die Ätiologie dieser Myositisform ist bis heute noch ungeklärt. Ob sie auf entzündlicher Basis beruht? Neuerdings führt man diese Muskelkrankung auf eine Konstitutionsanomalie zurück.

III.

Sehr viel schwieriger als die bereits behandelten Formen ist die neurogene Kieferklemme zu diagnostizieren. Sie ist, wie schon der Name besagt, nervösen Ursprungs und äußert sich in einem tonischen Krampfzustand der Kaumuskulatur, den wir mit dem Namen Trismus belegen und der von außerordentlicher Konsistenz ist. An sich ist dem Zahnarzt das Bild der neurogenen Kieferkontraktur geläufig, erscheinen doch die Patienten mit zusammengepreßten Kiefern meist zuerst bei ihm. Die ätiologischen Momente aber, die einen solchen Trismus hervorrufen,

sind von einer derartigen Mannigfaltigkeit, daß eine Mitarbeit des Chirurgen, Neurologen oder Internisten unbedingt erforderlich ist, allein schon, um die Ursache dieser Kieferklemme zu ergründen. Ätiologische Faktoren für diese Kontraktion sind Reize, die einmal direkt auf die motorischen Bahnen des Trigeminus an der Hirnrinde oder am Ganglion Gasserii einwirken oder indirekt, was meist der Fall ist, und dann von den sensiblen Nervenfasern aus über das Zentralorgan auf die motorischen Bahnen übergeleitet werden. Solche Reize können von allen Stellen des Körpers ausgehen, meist wird jedoch das sensibel vom Trigeminus versorgte Gebiet davon betroffen.

Verletzungen bei Zahnextraktionen, besonders wenn eine Periostitis vorausgegangen ist, oder wenn bei der Extraktion übermäßiger Druck auf die benachbarten Weichteile ausgeübt wurde, lassen diesen Trismus zustandekommen.

Einzwängungen der Weisheitszähne, Pulpenreizung, auch abgebrochene und im Wurzelkanal steckengebliebene Nervnadeln können diesen Kaumuskelkrampf auslösen. Selbst das Eindringen einer Borste der Zahnbürste in die Pulpa, was immerhin bei stark kariösen Zähnen möglich ist, hat schon zum Trismus Anlaß gegeben. Aktinomykose der Kiefer kommt auch in den Fällen ätiologisch in Betracht, wenn sie Gesichtsnuralgien entstehen läßt, die ihrerseits mit dem Trismus vielfach einhergehen. Auch die echte Trigeminusneuralgie ist schon verschiedentlich Ursache dieser Kontraktion gewesen.

Wessely vermutet dabei, auf Grund von zwei Krankheitsfällen, eine Komplikation an der Schädelbasis und zwar dann, wenn die Kieferklemme über längere Zeit andauert. Auch Alkoholinjektionen in das Ganglion Gasserii zur Behandlung der Trigeminusneuralgie sind in allerdings seltenen Fällen Ursache dieser Kaumuskelirritation gewesen. Chronische Oralsepsis hat ferner auch schon zu Kiefertrismus geführt, und zwar auf dem Wege über eine Neuralgie des Nervus mandibularis, der ein Infektiionsherd an den Zähnen zugrunde lag. Selbst Wurmreiz vom Darm aus kann sich in dieser Form auswirken, desgleichen Trichinosis. Vor allem aber sind allgemeine Neurosen ätiologisch für diese Art der Kieferklemme anzugeben. Eine wichtige Rolle unter diesen Ursachen spielt das Tetanustoxin, das ja ein schweres Zellgift des Körpers darstellt. Wie bekannt, sind Verletzungen, die mit Quetschung des Gewebes einhergehen, stets tetanusverdächtig. Und trotzdem braucht nicht immer eine größere gequetschte und verschmutzte Wunde vorhanden zu sein, es sind schon Tetanuskfälle beobachtet worden, bei denen ein kariöser Zahn, eine kleinste Wunde am Zahnfleisch oder am Naseneingang die Eintrittspforte waren. Die auslösende Wirkung erfolgt gewöhnlich nach 8—14 Tagen, und es ist wichtig zu wissen, daß bei diesem Krankheitsbild das allererste Symptom die Kieferklemme, der Kiefertrismus ist. Er stellt hier eine toxische tonische Kontraktur der Kaumuskeln dar und läßt die Masseteren als derbe Würste hervortreten. Erst dann wird auch der übrige Körper in den Krampfzustand versetzt. Bei Lösung der Kontraktion bleibt als längstes der Trismus, als risus sardonicus bekannt, bestehen. Die Strychninvergiftung ist in ihrer klinischen und biologischen Auswirkung der Giftwirkung des Tetanus durchaus gleichzusetzen. Das Strychnin findet bei den verschiedensten Krankheiten Anwendung, denn es wirkt, in kleinen Dosen gegeben, tonisierend wie ein Bittermittel. Bei Überdosierung oder Kummulation aber kommt es fast zu den gleichen Erscheinungen wie beim Tetanus, und zwar zunächst zu ziehenden Schmerzen in den Nacken- und Kiefermuskeln, dann zum Trismus und anschließend zu tonischen

und klonischen Krämpfen der glatten Muskulatur. Es ist deshalb stets bei totaler Kieferklemme ohne nachweisbare Ursache auch die Möglichkeit einer Behandlung mit Strychnin oder nux vomica in Erwägung zu ziehen.

Die Epilepsie äußert sich gleichfalls in zeitweisen Krampfanfällen. Im Anfang beherrscht ein tonischer Krampfzustand die gesamte Muskulatur, in den auch die Kiefermuskulatur mit einbegriffen ist. Die Zahnreihen sind dann so fest aufeinander gepreßt, daß es zu Zahn-, selbst zur Kieferfraktur kommen kann. Der Anfall geht dann aber sofort in das zweite Stadium über, in das Stadium der klonischen Zuckungen, bei denen wiederum die Kaumuskulatur mitbeteiligt ist, bewiesen durch den für die Epilepsie typischen Zungenbiß. Diese epileptischen Anfälle werden vielfach durch Zahnkrankheiten ausgelöst, durch Karies, Dentikelbildung, durch erschwerten Durchbruch des Weisheitszahnes; überhaupt kann erschwerte zweite Zahnung diese Gehirnkrankheit mit ihren Folgen erst zum Ausdruck bringen.

Der urämische Anfall, der auf Insuffizienz der Nieren beruht, sowie die Eklampsie wirken sich in gleicher Weise mit unter dem Bilde des Trismus aus.

Die Hysterie bringt alles zustande, selbst einen ausgesprochenen Kaumuskelkrampf, der nicht einmal durch den besseren Willen der Patienten zu beheben ist. Der Trismus auf hysterischer Grundlage zeichnet sich sogar durch besondere Festigkeit aus, er kann sogar bei längerem Bestehen eine Gewebsveränderung innerhalb der Muskeln herbeiführen. Selbst das Kiefergelenk ist gelegentlich mitbeteiligt. Es weist manchmal vor Ausbruch des Anfalles ödematöse Schwellung auf, doch kann diese Schwellung auch erst gleichzeitig mit dem Trismus eintreten. Auch die Meningitis, sowohl die epidemische als auch die eitrige, beginnt sehr häufig neben Erbrechen und Kopfschmerzen mit dem Trismus. Und im Endstadium der Meningitis sehen wir ebenfalls häufigst die zusammengepreßten Kiefer, den tonischen Krampf der Kaumuskulatur, der Ausdruck eines toxischen Reizzustandes des motorischen Anteils vom Trigeminus ist.

Und dann sind noch für diese neurogene Kieferklemme Tumoren im Gehirn, Apoplexie in der Medulla oblongata und der Beginn der akuten Bulbärparalyse als ätiologische Momente zu nennen.

IV.

Die letzte Form der Kieferklemme ist die narbige Kontraktur. Sie entsteht, wenn an die Stelle der Schleimhaut im Munde, vorwiegend in Bereiche des aufsteigenden Astes, jedoch auch außerhalb in der Wange, Narbengewebe tritt. In der Mundhöhle ist diese Kontraktur aus folgendem Grunde bedingt: Die Schleimhautfläche ist bei geöffnetem Munde beträchtlich groß, bei geschlossenem Munde dagegen wesentlich kleiner, ohne aber irgendwie in Falten zu liegen, ein Beweis also, daß die Schleimhaut sehr hohe Dehnbarkeit besitzt. Diese Elastizität der Schleimhaut ist für die Bewegungsmöglichkeit des Unterkiefers von wesentlicher Bedeutung. Werden nämlich die Schleimhaut, ebenso auch die Außenwange, durch irgendwelche Vorgänge verletzt und heilt diese Schädigung unter starker Narbenbildung ab, dann muß, gemäß dem Charakter der Narbenbildung, also Tendenz zur Schrumpfung, eine Kontraktur zustande kommen, deren Grad natürlich verschieden ist. Es kann nur eine leichte Öffnungsbehinderung vorliegen, jedoch kann diese Kontraktur auch einer Ankylose vollkommen gleichen. Dieses letzte trifft zu, wenn sich derbe Narbenstränge vom Unterkiefer zum Oberkiefer hinziehen und beide

fest miteinander verbinden. Diese Formen finden wir sehr häufig bei Kriegsverletzungen, die mit weitgehendster Zerreißung und Quetschung der Wangen- und Kaumuskeln einhergingen.

Schwere narbige Kontraktionen mit starker Fixierung des Unterkiefers können aber auch nach ausgedehnten geschwürigen Prozessen im Munde zurückbleiben, nach Stomatitis ulcerosa bzw. gangränosa, nach Typhusgeschwüren und nach Noma. Auch nach starken Verbrennungen ist nach der Abheilung die Bewegungsmöglichkeit des Unterkiefers stark beschränkt.

Therapeutische oder zufällige Verätzungen im Munde sind seltener ursächliche Momente für ernsthafte Narbenbildung mit Kieferklemme. Immerhin sind aber noch Fälle angegeben, wo eine merkurielle Stomatitis, als Folge einer zu reichlichen Kalomeltherapie bei Kindern, nach der Abheilung eine völlige narbige Fixierung des Unterkiefers herbeigeführt hat. Von besonderem Interesse aber ist, daß häufige Alkoholinjektionen an das Foramen mandibulare, so segensreich sie für den Patienten sind, die unangenehme Folge der narbigen Kieferklemme nach sich ziehen. Denn nach jeder Alkoholinjektion entwickelt sich am Einspritzungsort eine Narbe. Hierdurch sind im Laufe der Zeit nicht nur die Injektionen schwieriger auszuführen, sondern auch das Mundöffnungsvermögen wird durch dieses Narbengebiet beschränkt. Es ist deshalb sehr zweckmäßig, dem Patienten nach jeder Alkoholinjektion Dehnungsübungen anzuordnen.

Eine sehr hartnäckige Trigeminalneuralgie, vor allem im vorgeschrittenen Stadium, erheischt manchmal ein operatives Entfernen dieses befallenen Nerven. In vielen Fällen vollzieht sich die Heilung komplikationslos. Gelegentlich wurde jedoch eine narbige Kontraktur beobachtet, die eine Bewegungshemmung des Unterkiefers resultieren ließ. Das Karzinom der Wangentaſche ſowie alle größeren operativen Eingriffe laſſen ſich noch dieſem Kapitel mit einreihen. Die Karzinome z. B. zerſtören weitgehendſt die Schleimhaut und ſetzen ihre Elaſtizität herab; exſtirpiert man dieſe Ulzerationen ohne Schleimhauterſatz, iſt eine echte narbige Kontraktur die unerläßliche Folge. Der gleiche Vorgang vollzieht ſich bei größeren operativen Eingriffen, wenn nicht für plaſtiſche Deckung des Defektes ſorgt wird.

C. Die Behandlung der Kieferklemme kann ſich nach drei Richtungen hin erſtrecken. Sie kann konſervativ ſein, mechanische Therapie zur Anwendung bringen und rein chirurgiſche Maßnahmen erfordern. Die Wahl unter dieſen drei Möglichen richtet ſich nach der jeweiligen Urfache, die die Kieferklemme zur Auslöſung brachte.

Am häufigſten hat es der Zahnarzt mit der myogenen bzw. reflektorischen Kieferklemme zu tun. Dieſe Form der Kieferklemme iſt nach Entfernung des Grundübelſ durchaus konſervativ zu behandeln, und zwar einmal mit ſogenannten Hausmitteln: wamen, trockenen Tüchern, warmen Kamillenſäckchen, warmen trockenen Lehm-packungen, Heizkiffen, vom Zahnarzt angegebenen anti-phlogiſtinen Kompreſſen oder andererseits mit Beſtrahlungen mit der Solluxlampe oder mit Ultrakurzwellen. Nach der Extraktion von Weiſheitszähnen aber muß die mechanische Therapie die konſervative Behandlung vielfach noch unterſtützen in Form von Dehnungsübungen mit Gummi- oder Holzkeilen. Ausgeſprochene myogene Kontrakturen ſind im Anfang meiſt noch mit Wärme und Dehnungsübungen allein zu behandeln. Entlaſtungſchnitte oder operatives Entfernen einzelner Muskelteile mit anſchließender pla-

ftischer Deckung des Defektes dürften erst in ernsteren Fällen erforderlich sein.

Bei der neurogenen Kontraktur erstrebt die Therapie eine Beseitigung des Grundleidens selbst und liegt dem Neurologen bzw. Internisten ob.

Die Behandlung der narbigen Kieferkontraktur beschränkt sich in leichten Fällen auf Dehnungsübungen mit dem Holzkeil, anderenfalls auf systematische Behandlung mit dem zumeist angewandten Heister'schen Mundsperrerr. Die schweren Formen fallen in das Gebiet des Chirurgen, der, liegt die Störung im Mundbereich in der Gegend des aufsteigenden Astes, meist durch Anlegen einer Pseudarthrose vor der Narbenbrücke, verbunden mit plastischer Deckung, die Bewegung des Kiefers wieder ermöglicht, oder, liegt die Bewegungshinderung im äußeren Wangenbereich, die Narben excidiert, den großen Defekt durch Plastik wieder zur Deckung bringt und somit günstigere Verhältnisse für das Mundöffnen schafft.

Die arthrogene Kieferklemme aber, die durch akute Entzündungen des Kiefergelenkes hervorgerufen wird, erheischt meist ein umfangreicheres Behandlungsverfahren. In den Anfangsstadien allerdings ist die akute Arthritis erfolgreich konservativ mit Heißluft, Diathermie, Ultrakurzwellen und Wärmebestrahlung zu behandeln. Erst bei stärkeren Graden der Arthritis reicht diese Therapie allein nicht mehr aus, doch wird sie immer zur Unterstützung mit herangezogen. Klapp hat für akute eitrige und gonorrhöische Arthritiden die Rivanolbehandlung empfohlen, die auch allen Chirurgen (Wahsmund, Axhausen, Rosenthal u. a.) Erfolge gebracht hat. In manchen Fällen ließ sich schon nach einmaliger Behandlung eine Besserung des Zustandes feststellen. Trotzdem müssen Patienten mit eitriger Arthritis stets länger unter Beobachtung bleiben. Wenn nämlich das Fieber nicht sehr bald absinkt, auch die Schwellung der Gelenkgegend nicht sehr bald nachläßt, besteht die Gefahr, daß die Eiterung den Weg in die Tiefe nimmt. In solchen Fällen muß die konservative Behandlung sogleich abgebrochen und durch die chirurgische Behandlung, die operative Eröffnung des Kiefergelenkes, ersetzt werden, um dem Eiter den Abfluß zu verschaffen. Der andere Ausgang würde sonst in wenigen Tagen über eine eitrige Meningitis zum Tode führen.

Für die eitrige Arthritis, die mit Zerstörung von knorpeligen und knöchernen Gelenkanteilen einhergeht, fordern die meisten Chirurgen die Gelenkresektion, um eine Ankylose zu verhüten.

Rosenthal, zitiert bei Wahsmund, sagt: „Ist man gezwungen, auf das vereiterte Gelenk selbst loszugehen, und findet man wirklich ein Empyem mit Zerstörung des Meniskus und Affektion des Knorpelüberzuges der Gelenkflächen, so ist es am besten, die Resektion des Gelenkköpfchens anzuschließen. Dadurch erspart man dem Kranken die so gut wie sichere spätere Kieferversteifung mit allen üblen Folgen und kürzt den Verlauf wesentlich ab.“

Auch Lexer, zitiert von Wahsmund, äußert sich in gleicher Weise: „Gehen (nach Drainage des Gelenkraumes evtl. nach Eröffnung des Gelenkes durch Resektionschnitt) die örtlichen und allgemeinen Erscheinungen nicht zurück und ist der Gelenkknorpel in größerer Ausdehnung zerstört, so ist die Gelenkresektion am Platze. Die Gelenkresektion kommt bei schweren Zerstörungen der Epiphyse und des Gelenkknorpels, bei Durchbruch der Schaftphlegmone in Frage. Veränderungen der Gelenkknorpel führen zu Verwachsungen und Ankylosen.“

Auch Bruhn und Lindemann treten in solchen Fällen für eine Refektiotn des Gelenkes ein.

Wahsmund dagegen behauptet, daß bei der eitrigen Arthritis des Kiefergelenkes eine Gelenkrektion durchaus zu vermeiden ist bei konservativ-chirurgischer Behandlung. Er hat auf Grund dieser kombinierten Behandlung Heilung der Arthritis mit voller Funktion des Kiefergelenkes selbst dann beobachten können, wenn der tote Gelenkfortsatz als Sequester abgestoßen wurde. Selbst bei Nekrosen des Processus condyloideus hat er eine völlige Regeneration des Gelenkfortsatzes und eine vollkommene Wiederherstellung der Gelenkfunktion eintreten sehen.

Seine Behandlungsart und seine Grundätze sind folgende: Er eröffnet die Gegend des Kiefergelenkes oder das Gelenk selbst nur soweit, daß der Eiterabfluß durchaus gewährleistet ist. Dann wird ein Drain eingeführt, jedoch nur für möglichst kurze Zeit im Wundgebiet belassen, damit die Sekrete aus der entstehenden Fistel abfließen können. Tamponade der Wunde vermeidet er, ebenso entschließt er sich nicht zur operativen Entfernung von Gelenk- oder Knorpelteilen. Sein Grundatz ist, die natürlichen Heilkräfte des Körpers unter allen Umständen nur zu unterstützen. Deshalb nimmt er bei der nekrotisierenden Entzündung des Kiefergelenkes auch niemals früher als nötig die Entfernung der Sequester vor. Er wartet vielmehr so lange, bis die Natur von sich aus den toten Gewebkörper so weit abgestoßen hat, daß er vom Munde oder vom Kieferwinkel aus zu erreichen ist. Durch das lange Belassen der Sequester im Gelenk will er die Bildung einer Totenlade erzielen, die dann für den neu entstehenden Gelenkkopf formvorbereitend ist und andererseits auch das Verbacken der Gelenkflächen durch Narben- und Knochenmassen verhütet. Fixierende Verbände für den Unterkiefer wendet er aus diesem Grunde auch nicht an. Er beginnt vielmehr schon frühzeitig, nach Abklingen der akuten Entzündungserscheinungen, mit Dehnungsübungen, die erst mit dem Heifter, dann aber vom Patienten selbst ausgeführt werden. Unterstützt wird diese Therapie, wie schon gesagt, durch Wärmeanwendung und Bestrahlung. Mit dieser Behandlungsart hat Wahsmund selbst in den vorgeschrittensten Fällen nur Erfolge mit wertvollster Funktion des Kiefergelenkes erreicht, und Axhausen hat dieser Behandlungsweise in vollstem Maße beigestimmt.

Liegt allerdings schon eine Ankylose des Kiefergelenkes vor, dann fordert die chirurgische Behandlung die Entfernung der fixierenden Narben oder das Anlegen eine Nearthrose.

Für die rheumatische Arthritis kommt neben der Bestrahlungstherapie der Gebrauch pharmakologischer Mittel zur Beseitigung des Gelenkrheumatismus in Betracht: Salizyl Dosen in großen Mengen, bei schwersten Kreislaufstörungen Atophan, Synthalin, Ameisensäure oder Injektion von Myrmekan in das Gelenk. Für die Arthritis actinomycotica ist die Therapie als Grundatz noch nicht aufgestellt. Die Mehrzahl der Chirurgen fordert auch hier ein radiakles Vorgehen. Braun hat durch Refektion des Gelenkfortsatzes und durch Entfernen der Granulationen aus dem Gelenkraum den gewünschten Erfolg erreichen können.

Wahsmund aber tritt auch bei dieser Arthritis wieder für die kombiniert konservativ-chirurgische Behandlung ein. Er befürchtet nämlich, durch die Gelenkrektion den Bakterien ein weiteres Vordringen in die Tiefe zu ermöglichen und dadurch den glücklichen Ausgang in Zweifel zu stellen. Deshalb gibt er vom Jochbogen aus dem Eiter Abflußmöglichkeit aus dem Gelenkraum und sucht dann nur durch weitere Be-

strahlungstherapie zum Ziele zu kommen. Anfangs hat er Röntgenbestrahlung veranlaßt, unterstützt mit Jodkalithérapie. Der Erfolg war jedoch nicht günstig. Die Fistel schloß sich nicht, vielmehr war der Prozeß gegen diese Bestrahlungsart resistent geworden, auch wies die Haut des betreffenden Patienten nach einiger Zeit Röntgenschädigungen auf. Erst die Anwendung der Jod-Jontophorese brachte den erwünschten Erfolg. Nach zwölfmaliger Anwendung schloß sich die Fistel, der zerstörte Gelenkfortsatz wurde durch neugebildeten Knochen ersetzt, und das Mundöffnen war bis auf zwei Finger breit hin möglich. Auf Grund dieses Heilungserfolges ist auch in diesen Fällen diese Behandlungsart der Gelenkresektion vorzuziehen.

Überhaupt man das Kapitel „Ätiologie der Kieferklemme“, so muß man unbedingt die Mannigfaltigkeit der Ursachen feststellen, die eine Mundöffnungsbehinderung herbeiführen. Sie entstammen allen Gebieten der medizinischen Wissenschaft und zeigen damit, daß häufig ein Zusammenarbeiten der Vertreter dieser Gebiete erforderlich ist. Die größte Zahl der Fälle, mit denen es der Zahnarzt zu tun hat, betrifft die myogene Kieferklemme, danach folgen prozentual die arthrogen, neurogen und narbig bedingten Formen. Die Betonung der Landverbundenheit, wie sie durch Arbeitslager und Landdienst erreicht ist, bringt viele unserer Volksgenossen zum Glück wieder mit der Natur in engere Berührung, fördert aber durch die üble Angewohnheit, Gräser, Strohhalme usw. in den Mund zu nehmen, die Infektionsgefahr durch den Aktinomyces, so daß man in Zukunft mit einer Zunahme der Aktinomykosefälle zu rechnen haben wird.

Der theoretischen Abhandlung werden zur praktischen Erläuterung noch einige Krankengeschichten beigelegt, die auf der chirurgischen Abteilung der Mund-, Zahn- und Kieferklinik Bonn gesammelt wurden.

Krankengeschichten.

Fall I. Patient Bartel Schl, 11 Jahre alt.

Anamnese: Mit starken Schmerzen in der Gegend des Unterkiefers rechts und hohem Fieber wurde der Patient im 2. 12. 1934 abends ins Josefs-Hospital eingeliefert.

Klinischer Befund: Starke Schwellung in der Submaxillargegend, Zunge hochstehend, Schlucken erschwert. Hochgradige Kieferklemme, Temp. 40,5, 6] periodontitisch.

Röntgenbefund: Das Röntgenbild zeigt keine pathologischen Veränderungen.

Diagnose: Mundboden-Abszeß.

Therapie: Wegen starken Stridors erfolgt um 22.30 Uhr die Eröffnung (extraoral) eines großen Mundboden-Abszesses unter Lokalanästhesie. Drainage der Abszeßhöhle. Die Zahnreihen können soweit auseinander gebracht werden (Heifter), daß die Extraktion des ersten Molaren möglich ist. Solluxbestrahlungen.

Klinische Behandlung: 3. 12. Incision des Mundbodenabszesses. T. 40,5 6| mit Injektion entfernt. Drainage des Abszesses.

4. 12. Solluxbestrahlung. T. 38,5.

5. 12. Drainage ab. T. 37,5.

6. 12. Solluxbestrahlung. T. 37,2.

13. 12. Röntgenkontrolle.

26. 12. Röntgenkontrolle.

Patient entlassen.

Fall II. Patient Albert H., 25 Jahre alt.

Anamnese: Am 4. 10. 34 stellten sich geringe Schmerzen in der Gegend des 8 ein. Am 10. 10. wird der Arzt konsultiert wegen kleiner Knötchen (Unterkieferdrüsen); es wird als Erkältung angesprochen, mit Amolwatte, heißem Öl behandelt und gegen die Schmerzen Tabletten verordnet. Am 17. 10. starke Schwellung, und wegen großer Schmerzen wird der Patient in die Chirurgische Universitätsklinik Bonn überwiesen und von dort am 18. 10. in die Universitätspoliklinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten.

Klinischer Befund: Überaus starke Schwellung und Rötung der ganzen rechten Gesichtshälfte vom Jochbogenrand bis zur Halsmitte, vom Mundwinkel bis zum hinteren Rande des aufsteigenden Astes, die ihre stärkste Ausdehnung im Bereiche des aufsteigenden Astes hat. Es besteht vollständige Kieferklemme, ferner Schluckbeschwerden und Schmerzhaftigkeit der regionären Lymphdrüsen.

Röntgenbefund: Das Röntgenbild läßt deutlich zwei ineinandergeschobene Zähne erkennen, von denen die eine Krone oralwärts, die andere entgegengesetzt über dem Mandibularkanal liegt. Das ganze Bild läßt ein Odontom vermuten.

Diagnose: Submaxillar-Abszeß, ausgehend von einem abszedierenden Odontom hinter 7.

Therapie: Entfernung des Odontoms.

Klinische Behandlung:

18. 10. Unter Basisinjektion Ausmeißelung eines Odontoms, Naht, Tampon. Temp. 39,2.

19. 10. Die harte Drüenschwellung ist weicher geworden, die Schmerzen sind zurückgegangen, T. auf 39,8 gestiegen. Spülung mit H₂O₂, Tamponwechsel, Kälte verordnet.

20. 10. Spülung, Tamponwechsel, T. auf 38° gefallen. Schwellung zurückgegangen.

21. 10. Tamponwechsel, Kieferklemme zurückgegangen. Nach weiteren 8 Sitzungen, bestehend aus Rivanolpülungen und Solluxbestrahlungen, konnte der Patient in ambulante Behandlung entlassen werden.

Fall III. Patient Johann Kr., 30 Jahre alt.

Anamnese: Der Patient schlug am 13. 5. mit dem Kinn auf den Boden, am 17. 5. suchte er die Zahn-, Mund- und Kieferklinik auf.

Klinischer Befund: Beim Öffnen des Mundes weicht der Unterkiefer nach rechts ab. Die Mittellinie ist um 2 mm nach rechts verschoben. Der Patient verspürt beim Essen Schmerzen im rechten Kiefergelenk. Es besteht leichte Kieferklemme. 5 4| sind bis ungefähr 3 mm unter das Zahnfleisch in der Richtung ihrer Achsen gespalten.

Röntgenbefund: Das Röntgenbild zeigt eine Frakturlinie, die den rechten Condylus vom aufsteigenden Ast abtrennt.

Diagnose: Unterkieferbruch (Bruch des rechten Condylus).

Therapie: Ruhigstellung durch Sauer-Schiene. Retention durch Schröder'sche Gleitschiene und Gummizüge.

Klinische Behandlung:

15. 5. Die gespaltenen Prämolaren wurden durch Ligaturen zusammengehalten. Röntgenaufnahme. Zahnreinigung, Stentsabdrücke.

18. 5. Obere und untere Schiene eingesetzt. Ligaturen. Gummizüge. (An der unteren Schiene wurde auf der linken Seite in der Gegend der Molaren eine Schröder'sche Gleitschiene angebracht.)

21. 5. Schröder'sche Gleitschiene entfernt.

27. 5. Kontrolle.

28. 5. Ligaturen erneuert. Gummizüge.

1. 6. Gummizüge.

8. 6. Röntgenkontrolle, Schiene entfernt, Termin zur Nachuntersuchung.

Patient zur Nachuntersuchung nicht erschienen.

Fall IV. Patient Jakob B., 25 Jahre alt.

Anamnese: Der Patient ist als Fabrikarbeiter auf dem Walzwerk in Niederbieber bei Neuwied tätig. Am 14. Juli erlitt er den Unfall.

Beim Blechwalzen preßte sich plötzlich ein großes Stück Blech los und schlug ihm mit solcher Wucht an die rechte Wange, daß er weit fortgeschleudert wurde. Man verlor ihn zunächst auf der Verbandstation des Werkes, schaffte ihn dann in das dortige Elisabeth-Krankenhaus, wo die erheblichen Rißwunden am Jochbogen und Kieferwinkel gefäubert und genäht wurden. Am folgenden Tage schickte man ihn in die Mund-, Zahn-Kieferklinik in Bonn.

Klinischer Befund: Die rechte Wange des Patienten ist stark geschwollen und zeigt zwei große Wunden am Jochbogen und Kieferwinkel. Die Kieferklemme ist fast total. $\overline{3}$ ist stark gelockert.

Röntgenbefund: Das Röntgenbild zeigt die Frakturen zwischen $\overline{3}$ und $\overline{2}$ und am rechten aufsteigenden Ast.

Diagnose: Doppelter Unterkieferbruch.

Therapie: Reposition und Schienung der Frakturteile.

Klinische Behandlung:

16. 6. Röntgenaufnahme extraoral, O.K. und U.K. Stentsabdrücke, Drahtligatur.

17. 6. Manuelle Reposition c.Ltg. Retention durch einfache intraorale Drahtschiene mit Häkchen. Drahtligaturen und Gummiligaturen.

Vom 18. 6. bis 18. 7. bestand die Behandlung in Reinigen der Mundhöhle, Nachziehen der Ligaturen und Erneuerung der Gummizüge.

20. 7. wurde $\overline{3}$ extrahiert und 6 Sequester entfernt. Bis zum 26. 8. Spülungen mit H_2O_2 , Tamponwechsel, Erneuerung der Gummizüge.

26. 8. Das Röntgenbild zeigte eine einwandfreie Extraktionshöhle und die Festigung der Frakturen. Auch die Kieferklemme war behoben.

Der Patient wurde geheilt entlassen.

Fall V. Patientin Gertrud Schm., 26 Jahre alt.

Anamnese: Patientin wird von Dr. R. aus B. in die Klinik überwiesen. Seit einigen Tagen besteht langsam zunehmende Schwellung und Schmerzhaftigkeit in der Gegend des rechten unteren Weisheitszahnes. Das Schlucken ist äußerst schmerzhaft und macht der Patientin die Nahrungsaufnahme beinahe unmöglich.

Klinischer Befund: Die Gegend des Kieferwinkels ist stark geschwollen und druckempfindlich. Es besteht eine hochgradige Kieferklemme bei starkem Foetor ex ore.

Röntgenbefund: Die Krone des Weisheitszahnes ist nach mesial hin vollkommen zerstört. Um die Wurzelspitze lokalisiert sich ein kleiner nicht abgegrenzter Aufhellungsherd.

Diagnose: Mundboden-Abszeß, ausgehend von einem gangränösen Weisheitszahn im Unterkiefer rechts.

Therapie: Extraktion des $\overline{8}$ und Eröffnung des Abszesses.

Klinische Behandlung:

24. 5. Extraktion des $\overline{8}$ mit Leitungsanästhesie. Tampon.

25. 5. Tamponwechsel, Wärmebehandlung.

27. 5. Es hat sich ein Mundbodenabszeß gebildet, der unter Lokalanästhesie eröffnet und durch einen Kofferdammstreifen offen gehalten wird.

18. 5. Die Schwellung ist im Bereich der Submaxillargegend erheblich größer geworden. Incision (extraoral) in Evipan-Narkose.

29. 5. Extraorale Incision verbreitert (Äthernarkose). Drainage, Schutzverband. Bis 4. 6. täglich Nachuntersuchung und Verbandwechsel.

4. 6. Patient in ambulante Behandlung entlassen. Kieferklemme und Schwellung weitgehend zurückgegangen, Mundboden frei.

Fall VI. Patient Friedrich E., 60 Jahre alt.

Anamnese: Der Patient ist seit 3 Jahren in ärztlicher Behandlung. Vor 3 Jahren traten Schmerzen am linken Kieferwinkel auf, die zum Ohr ausstrahlten und sich auch über den Oberkiefer ausdehnten. Gleichzeitig setzte heftiges Ohrenlaufen ein, das sich bis zur Schwerhörigkeit steigerte, so daß er monatelang fast völlig taub war; das rechte Ohr war infolge einer Kriegsverletzung vollkommen außer Funktion gesetzt. Der Patient suchte den Arzt auf und wurde auf Ohrenleiden behandelt. Der Zustand verschlimmerte sich, Schmerzen der ganzen linken

Kieferseite, besonders im Gelenk und im Ohr quälten ihn, auch die Zähne schmerzten, er hatte ein stumpfes Gefühl an ihnen, wie wenn er in einen sauren Apfel gebissen hätte. Dann trat Gelenkknacken auf, ebenso Steifigkeit in den Muskeln und zwar derart, daß er drauf und dran war, den Mund nicht mehr auf zu bekommen, 5 Ärzte behandelten ihn auf Ohrenleiden, Nervenleiden und auf verschleppten Katarrh. Wegen eines Zahnes ging er eines Tages zu einem Dentisten in Rh., und dieser überwies ihn der Zahn-, Mund- und Kieferklinik.

Klinischer Befund: Die Gegend des linken Kiefergelenkes ist etwas verdickt. Der Patient kann mit Mühe $1\frac{1}{2}$ cm den Mund öffnen. Bei der Öffnungs- und Schließbewegung deutlich hörbares Knacken im linken Kiefergelenk.

Röntgenbefund: Das Röntgenbild zeigt ein pilzförmig abgeflachtes Kieferköpfchen, in welchem auch Verkalkungspunkte zu sehen sind.

Diagnose: Arthritis deformans.

Therapie: Diathermiebehandlung.

Klinische Behandlung:

Vom 9. 7. bis 30. 8. zweimal wöchentlich 10 Minuten Solluxbestrahlungen. Am 30. 8. konnte der Patient entlassen werden. Das Knacken im Kiefergelenk war behoben und der Mund konnte beschwerdelos fast normal geöffnet werden.

Fall VII. Patientin Sibille Schw., 37 Jahre alt.

Anamnese: Ofters vor einem Jahr trat plötzlich Knacken im linken Kiefergelenk auf. Steifigkeit in den Muskeln setzte ein, und der Mund konnte nicht in der gewohnten Weise geöffnet werden. Die Patientin hat aber nichts dagegen getan, weil diese Beschwerde nur zeitweise, dann aber ganz plötzlich in Erscheinung trat. Oft wurde die Kieferklemme schon durch das Zähneputzen ausgelöst. Schmerzen hatte sie auch nur zeitweise, lokalisiert im linken Kiefergelenk, von dort zum Ohr und zum Halbe hinunter ausstrahlend. Die Patientin vermutete schließlich in einem Zahn die Ursache dieser Beschwerde und kam in die hiesige Mund-, Zahn- und Kieferklinik.

Klinischer Befund: Leichte Kieferklemme. Zahnbefund gut. Leichtes Knacken im linken Kiefergelenk.

Röntgenbefund: Verbreiterung des Gelenkspaltes.

Diagnose: Subakute Kiefergelenkentzündung.

Therapie: Diathermie.

Klinische Behandlung: Vom 15. 5. bis 18. 8. zweimal wöchentlich 10 Minuten Kurzwellen. Am 18. 8. Röntgenkontrolle. Kieferklemme behoben. Knacken im Gelenk nicht mehr wahrnehmbar. Patientin entlassen.

Fall VIII. Patient Friedrich Gl., 54 Jahre alt.

Anamnese: Nach der Extraktion des rechten unteren zweiten Molaren langsam zunehmende Schwellung und Schmerzhaftigkeit im Bereiche der Gesichtswichteile in der Gegend des Kieferwinkels.

Klinischer Befund: Extraoral: Erhebliche Schwellung in der Gegend des vorderen Masseterrandes bis zum Kieferwinkel.

Intraoral: Die Alveole des 7¹ zeigt normale Heilungsverhältnisse. Es besteht eine starke Kieferklemme.

Röntgenbefund: Die Röntgenbilder sind o. B.

Diagnose: Periofitis.

Therapie: Incision und Drainage.

Klinischer Verlauf: Die Incisionswunde heilte gut ab. Die Kieferklemme wurde behoben und der Patient geheilt entlassen.

Fall IX. Patient Peter H., 37 Jahre alt.

Anamnese: Der Patient ging am 3. 8. 36 wegen Schmerzen des linken Backenzahnes zum Dentisten, um sich den Zahn entfernen zu lassen. Der Dentist vertröstete ihn jedoch einige Tage mit dem Rat, warme Packungen und Spülungen mit Leinfamentee zu machen. Weil die Schmerzen und die schon vorhandene Schwellung aber zunahmen, ging der Patient nach 2 Tagen wieder zu dem Dentisten mit dem Erfolg, daß ihm die Amalgamfüllung aus dem Zahn entfernt wurde. Die Schwellung nahm weiter zu, und der Patient kam deswegen am folgenden Tage in die Mund-, Zahn- und Kieferklinik.

Klinischer Befund: Der Patient kann wegen starker Kieferklemme den Mund kaum öffnen. Die regionären Drüsen der linken Seite

sind stark geschwollen und druckempfindlich. Auch die linke Halspartie ist infiltriert. $\overline{8}$ ist tief kariös, druckempfindlich, auch der Kieferknochen schmerzt auf leichten Druck hin. Die Schleimhaut ist gerötet, die Weichteile sind stark infiltriert.

Röntgenbefund: Das Röntgenbild zeigt einen erheblichen Herd an der distalen Wurzel des $\overline{8}$ mit Anzeichen einer beginnenden Knocheneinschmelzung.

Diagnose: Eitrige Periodontitis.

Therapie: Nach extraroraler Injektion Entfernung des $\overline{8}$.

Klinische Behandlung:

6. 8. $\overline{8}$ Röntgenaufnahme. $\overline{8}$ ex. c. Basis.
7. 8. $\overline{08}$ H₂O₂ Tampon, Wärme.
8. 8. $\overline{08}$ Rivanol, Tamponwechsel, 15 Minuten Sollux.
11. 8. Kontrolle, Patient entlassen.

Fall X. Patient Nikolaus L., 31 Jahre alt.

Anamnese: Der Patient bekam heftige Schmerzen im linken unteren Molarenggebiet, die aber nach geraumer Zeit etwas nachließen. Er ging zu einem Dentisten, um sich den schuldigen Zahn entfernen zu lassen. Der Dentist überwies ihn der hiesigen Klinik.

Klinischer Befund: Der Patient hat eine Kieferklemme zweiten Grades, links leichte Drüenschwellung, geringe Temperatur. Das Gebiet des $\overline{8}$ ist weitgehend entzündet, tiefe Taschenbildung.

Röntgenbefund: Das Röntgenbild zeigt den verlagerten Weisheitszahn, er ist nach mesial gekippt, dort unter der Krone des $\overline{7}$ verhakt und hat am Zahnhals des $\overline{7}$ schon zu Resorptionsercheinungen geführt.

Diagnose: Erforderter Durchbruch des Weisheitszahns.

Therapie: Entfernung des $\overline{8}$.

Klinische Behandlung: Zunächst wurde mit Sollux bestrahlt. Dann nach Basis-Injektion $\overline{8}$ extrahiert.. Nach der Extraktion Schwellung der ganzen linken Wange bis zum Halbe hinunter. Gegen Abend Schiefstellung des Mundes und starke Kieferklemme. Am folgenden Tage war die Parotis noch etwas mitgeschwollen, die Kieferklemme ohne Schiefstellung des Mundes in gleichem Maße vorhanden, und wegen Infiltration der Weichteile Schluckbeschwerden. Geringe Temperatur. Nach dem 4. Tamponwechsel, der 4. Spülung mit H₂O₂ sowie der Bestrahlung mit Sollux trat Besserung ein. Der Patient wurde bald darauf geheilt entlassen.

Es ist mir eine angenehme Pflicht, Herrn Prof. Dr. Proell für seine außerordentlich liebenswürdige Hilfsbereitschaft meinen herzlichsten Dank zum Ausdruck zu bringen.

Literaturverzeichnis.

- Axhausen: Pathologie und Therapie des Kiefergelenkes. Fortschr. Chir. 1930 und 31.
- Berberich: Lehrbuch der Mund- und Rachenkrankheiten 1932.
- Bruns: Beiträge zur klinischen Chirurgie 1935, Heft 3.
- Fabian: Beiträge zu den Funktionsstörungen der Kiefermuskeln bei Schußverletzungen. Erg. d. gef. Zahnheilk. Bd. 6, II. Heft 1920.
- Kantorowicz: Klinische Zahnheilkunde Bd. I.
— Handwörterbuch der gesamten Zahnheilkunde. Bd. I, II, III, IV.
- Misch: Lehrbuch der Grenzgebiete der Medizin und Zahnheilkunde 1914.
— Zeitschr. f. Stomat. 1934.
- Partsch: Erkrankungen der Hartgebilde des Mundes 1932.
- Perthes: Verletzungen und Krankheiten der Kiefer 1907.
- Seifert: Lehrbuch der Chirurgie des Kopfes und Halses für Zahnärzte.
- Sterling: Syphilis der Kiefergelenke. Monatschr. f. prakt. Dermatologie Bd. 44.
- Wahsmund: Praktische Chirurgie des Mundes und der Kiefer 1934.
- Handbuch der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde mit Einschluß der Grenzgebiete, Bd. II und III.
- Handbuch der praktischen Chirurgie, Bd. I. Herausgegeben von Garré, Küttner und Lexer 1926.
- Deutsche Zahnheilkunde, Forschung u. Praxis, Sonderheft 1920.
- Deutsche Zahnheilkunde, Forschung und Praxis 1932.
- Zahnärztliche Rundschau, Jahrgang 1928 Nr. 12.
- Zahnärztliche Rundschau Jahrgang 1928 Nr. 22.
- Zahnärztliche Rundschau Jahrgang 1933 Nr. 50.
- Zahnärztliche Rundschau Jahrgang 1934 Nr. 46.
- Zahnärztliche Rundschau Jahrgang 1921 Nr. 43.
- Spezielle Chirurgie für Stud. u. Zahnärzte IX.—X. Aufl. Berlin 1912.
- Fortschritte der Zahnheilkunde, Literaturarchiv 1933.
- Deutsche Zeitschrift für Chirurgie Bd. X.
- Archiv für klin. Chirurgie Bd. I.
- Schwartz: Arthritis deformans des Kiefergelenkes, Deutsche Monatsschrift f. Zahnheilk. 1929.
- Weber: Deutsche Zahnheilkunde 1933, Heft 91.
- Effer: Bonn Med. Diss. 1934.
- Weinstein: Bonn Med. Diss. 1933.
- Berresheim: Köln Med. Diss. 1932.

Lebenslauf.

Am 17. November 1909 wurde ich, Doreliefe Kühne, als Tochter des Mittelschullehrers Albert Kühne und seiner Ehefrau, Ida geb. Japp in Dortmund geboren. Den ersten Unterricht erhielt ich zu Hause von meinem Vater. Dann besuchte ich das Schillerlyzeum, anschließend die Real-Gymnasial-Studienanstalt in Dortmund, wo ich Ostern 1930 die Reifeprüfung bestand. Ich widmete mich dem Studium der Philologie an der Universität Köln. Ab Wintersemester 1931 studierte ich in Bonn Zahnheilkunde, bestand am 12. Mai 1933 die zahnärztliche Vorprüfung und am 31. Mai 1935 das zahnärztliche Staatsexamen, mit dem ich gleichzeitig die Approbation erhielt.

